



绛县眼科医院专家简介



罗荣

罗荣,副主任医师,北京解放军总医院眼科博士。1999年—2002年于中国协和医科大学攻读硕士研究生,师从我国著名的眼科专家、防盲专家中华医学会眼科分会眼科主任委员赵家良教授;2003年—2004年由荷兰喜马拉雅基金会支持赴尼泊尔位于Bharatpur的喜马拉雅眼科医院和印度阿拉文眼科中心进行小切口白内障和超声乳化白内障摘除手术专业培训;2011年北京解放军总医院攻读博士研究生,师从全军准分子激光及角膜病首席专家黄一飞教授,从事眼角膜病研究;2005年—2014年至今,个人累计完成白内障复明手术20000多例。



袁军

袁军,主任医师,郑州市第二人民医院白内障、青光眼、眼整形专家,郑州市眼科专业委员会秘书,河南省美容整形学会委员。二十年来,不仅完成上万例白内障超声乳化手术,而且在眼科整形美容方面有很多创新和突破,首创的“羟基磷灰石义眼座植入联合结膜囊狭窄改良术”、“羟基磷灰石义眼座加固巩膜层垫术”等均处于全国领先水平,多项科研项目获省、市科研成果奖。



丁相奇

郑州市第二人民医院眼科白内障三病区主任、主任医师,郑州市医学会眼科学会委员,郑州市医师协会眼科副主任委员,郑州市中西医结合眼科学会副主任委员。专业特长:白内障、角膜病,青光眼以及眼科疑难重症的诊断和治疗,尤其在白内障方面有较深的造诣,率先在省内开展了小切口非超声乳化白内障摘除联合人工晶状体植入和超声乳化白内障摘除联合人工晶状体植入,并较早开展了有晶体眼人工晶状体植入和多焦衍射人工晶状体等多种特殊人工晶状体植入术。热衷公益事业,连续多年参加中残联和国际狮子会的“视觉第一,中国行动”白内障手术医疗队赴省内、外手术,2000年曾赴“健康快车”手术。发表论文十余篇,参编眼科专著一部,获多项省市级科研成果。



武耀红

武耀红,山西医科大学第二医院眼科副主任,主任医师,教授。从事综合眼科临床、教学和科研工作27年。在白内障、青光眼、眼表疾病、泪道病、眼部整形与美容等方面有优势,尤其在处理复杂泪道手术上有独到之处。在眼和全身以及高龄高危眼病患者,重症复杂眼外伤的救治方面做了大量工作,形成一套合理高效的诊治流程,最大限度的保证了医疗安全,拥有超过两万例的各种眼科手术成功经验,发表学术论文30余篇。社会职务:中国超声医学工程学会眼科分会常务委员、山西医学整形美容学会委员、山西省眼科学会委员、陕西省医学会科学普及委员会常委科普宣讲团团长、中国中西部儿部先天性疾病及贫困人口白内障复明工程山西项目技术指导专家组成员、山西医师协会眼科分会常委、山西省社区卫生服务协会专家指导委员会委员、山西省干部保健局特约专家。荣获山西省卫生系统先进典型、医德楷模、三晋好医生等称号。



朱跃弟

朱跃弟,硕士学位,眼科主治医师,高级验光师。2003年7年毕业于山西医科大学,2003年9月至今在卫校附属医院眼科工作,擅长眼科常见疾病的诊治,尤其擅长小儿斜弱视的诊治和高难度复杂性屈光不正的矫正。




刘志飞

刘志飞,医师,武汉科技大学临床医学毕业,免疫学硕士。2004年—2009年于武汉科技大学医学院学习获学士学位;2009年—2012攻读医学免疫学专业获医学硕士学位;2012年至今在湖北省汉川市人民医院眼科工作;2012年至今,个人累计完成内翻倒睫矫正术、眼睑肿物切除术、翼状胬肉手术共计约400多例。

白内障

认识白内障



凡是各种原因如老化、遗传、局部营养障碍、免疫与代谢异常、外伤、中毒、辐射等,都能引起晶状体代谢紊乱,导致晶状体蛋白质变性而发生混浊,称为白内障。正如右图所示,就如同照相机的镜头发生混浊而无法拍出清晰的相片一样,当我们的晶体发生混浊就会造成视物不清的现象。随着病情发展混浊部位逐渐增大,最终会遮盖住我们眼睛的整个“镜头”形成失明。

白内障治疗方法



手术是目前治疗白内障唯一有效的方法,通过手术治疗绝大部分患者可恢复到正常视力。白内障超声乳化术+人工晶体植入是目前治疗白内障主流方法,而冷超乳技术则是对超声乳化术的进一步发展,能减少术中灼热,使手术损伤更小,术后反应更轻,恢复更快。

白内障人工晶体有哪些?

普通硬性人工晶体:切口5.5mm;
折叠人工晶体:切口为2.4mm,创伤小,恢复快;
防蓝光折叠人工晶体:可滤过对眼睛有害的紫外线和蓝光,对眼底有较好的保护作用;

多焦点折叠人工晶体:术后不需要配花镜,可同时满足远用及近用,获得较为满意的全程视力;
非球面人工晶体:光学设计更接近人眼的晶状体,提高患者夜间视力。

如何选择人工晶体?

选择人工晶体主要应考虑三方面因素:
第一:考虑自身实际的生活需要,是否需要选择功能性较强的人工晶体;
第二:考虑自身的身体状况及病情需要,便

如糖尿病患者最好选用小切口的人工晶体;
第三:考虑自己的经济状况,功能性越强的人工晶体价格也越高。

绛县眼科医院 白内障超声乳化术	PK	传统白内障手术
无需完全成熟	手术时机	白内障成熟时
2.4mm	切口大小	6-10mm
切口无需缝合	缝合与否	切口一般需要缝合
表面麻醉	麻醉方式	球后麻醉
约5-10分钟	手术时间	约30分钟
较轻	眼组织损伤及术后炎症	较重
术后第二天	恢复时间	7-10天